NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

IHReS

Slide Kit Formation

Ordre du jour

- 1. Qu'est-ce qu'un hémangiome infantile?
- 2. Les différents types d'hémangiome infantile (HI)
- 3. Evolution naturelle et les différents stades
- 4. Diagnostic
- 5. Qui traiter?
- 6. IHReS
- 7. Outils IHReS

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

1. Qu'est-ce qu'un hémangiome infantile?

Hémangiome Infantile (HI)

- ... Tumeur vasculaire bénigne
- ... Prolifération des vaisseaux sanguins sous et sur la peau

Classification ISSVA des anomalies vasculaires

L'hémangiome infantile en images

La tumeur bénigne la plus fréquente chez le nourrisson ¹

**Hémangiome infantile
superficiel avec
déficience visuelle**

**HI Superficiel sur la
paupière inférieure**

**HI mixte au niveau
de la poitrine**

1- Storch CH, Hoeger PH. Propranolol for infantile haemangiomas: insights into the molecular mechanisms of action. Br J Dermatol. 2010;163:269-274

Epidémiologie et facteurs de risque

Tumeur bénigne la plus fréquente chez l'enfant

~ **5%**

des nourrissons < 1 an^{1,2,4}

Jusqu'à **23 % chez les prématurés³**

pesant < 1 kg à la naissance

Sexe Ratio		
	♀	♂
Pop. Générale ^{2,4}	1	= 1
Consult. Spé. ⁵ (hémangiomes sévères)	3	> 1

Stress Hypotoxique ⁶

Petit poids de naissance - Âge maternel avancé -
Prématurés (25-29 semaines) - Grossesses multiples -
Placenta praevia -Pré-éclampsie

Facteurs génétiques ?

- Population caucasienne
- Filles
- Antécédents familiaux d'hémangiome³

Facteurs de risque ⁵

1. Léauté-Labreze et al – Infantile Haemangioma –Lancet 2017 Jul 1;390 (10089): 85-94
2. Munden et al – Incidence and demographics of IH – BJD 2014, 170; 907-913
3. Goelz R et al. Incidence and treatment of infantile hemangioma in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2015; 100 F85-91
4. Volc-Platzer et al. – Poster ESPD 2014
5. Chen et al. Update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2012
6. Léauté-Labrière C. et al. Infantile Hemangioma. Press Med. 2010;
7. Holland K. et al. Approach to the patient with an Infantile Hemangioma. Dermatol Clin. 2013

Hémangiomes infantiles

Prendre en compte le fardeau de la maladie sur l'entourage ¹

- Impact psychologique observé chez plus de **70 %** des parents
 - Regard des autres sur la pathologie de l'enfant
 - Angoisse, anxiété
- Accompagnement psychologique proposé dans **moins de 10%** des cas
- Impact sur la vie professionnelle dans **50 %** des cas
 - Pour **1/3** des parents, nécessité d'adapter l'organisation du travail
- **43 %** ont du faire appel à une aide à domicile pour faciliter l'organisation quotidienne de la vie de famille

¹Cazeau et Al. Burden of Infantile Hemangioma on Family: An International Observational Cross-Sectional Study. *Pediatr Dermatol.* 2017 May;34(3):295-302. doi: 10.1111/pde.13133. Epub 2017 Apr 6.

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

2. Différents types d'hémangiome infantile

Caractéristiques des hémangiomes infantiles

1

Par type

- Superficiel
- Profond
- Mixte

2

Par distribution

- Segmentaire
- Localisé/focal
- Multifocal

3

Par localisation

- Tête / cou
- Reste du corps

Pas de classification officielle

Un aspect différent d'un enfant à l'autre

1

HI Superficiel « fraise »

- Lésions rouge vif
- Plaquelike ou lésions tubéreuses
- Surface irrégulière

2

HI Profond (HI « caverneux »)

- Localisation dans le derme profond, sous-cutané
- Nodules bleutés ou de la couleur de la peau
- Surface lisse

3

HI Mixte

- Présente les caractéristiques des hémangiomes superficiels et profonds
- Souvent une plaque rouge recouvrant un nodule bleuté

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

3. Evolution naturelle de l'hémangiome infantile et les différents stades

Evolution de l'hémangiome¹

Il est important d'adresser au plus vite les patients pendant la phase de prolifération. L'âge optimal pour adresser vers un centre spécialisé est à 4 semaines^{2,3,4}

Si il y a un doute sur la nécessité d'un adressage immédiat, le suivi doit prendre en compte l'âge du patient

Age en mois = intervalle de suivi en semaines⁽³⁾

1 mois = 1 semaine

1. Léauté-Labreze C. et al – Infantile Haemangioma –Lancet 2017 Jul 1;390 (10089): 85-94
2. Tollefson M et al – early growth of IH : what parents' photographs tell us – Pediatrics – 2012 –
3. Hoeger P et al - Treatment of infantile haemangiomas: recommendations of a European expert group – Eur J pediatr 2015
4. Krowchuk D.P. et al- Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas, Pediatrics, Jan2019, vol 143, Issue 1

Signes précurseurs 1,2,3

1. Frieden et al – Guidelines of care for hemangiomas of infancy – JAAD – 1997
2. Tollefson et al. Early Growth of Infantile Hemangiomas: What Parents' Photographs Tell Us. Pediatrics 2012;130:e314
3. Grunwaldt et al - Infantile Hemangiomas Are Often Present at Birth – ISSVA 2016

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

4. Diagnostic

Diagnostic

DIAGNOSTIC : Clinique

Histoire de l'HI = facteur clé

Facteurs de risque (hypoxie)

Présent à la naissance : OUI / NON

Prolifération après la naissance: OUI / NON

Photos disponibles pour voir l'évolution de l'hémangiome

Doute ? (masse sous-cutanée)

Eccho-doppler

Diagnostic

Diagnostic: d'abord clinique

↓ Doute ? (masse sous-cutanée)

Écho-doppler

- Phase proliférative : Tumeur hypoéchogène et hypervascularisée avec faible résistance
- Phase Involutive : lésion hypoéchogène avec un aspect fibro-adipeux, et faiblement vascularisée

Extension en profondeur à des régions spécifiques ?
Orbite – Parotides – Cou – Périnée

Lésions viscérales ?
Foie, ...

IRM

Bilan d'extension
(PHACE, LUMBAR ou pour certaines formes compliquées)

Artériographie aortique et cérébrale, échocardiographie cardiaque, IRM du rachis lombaire et appareil urinaire ...

Biopsie

Glut 1 +

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

5. Qui traiter?

Hémangiomes infantiles à haut risque

Pourquoi un adressage précoce ?

► **5** risques à prendre en compte ◀

HEMANGIOMES INFANTILES À HAUT RISQUE

RISQUE VITAL

HÉMANGIOME
EN BARBE

SUSPICION D'HI
SOUS - GLOTTIQUE

**Obstruction des voies
respiratoires**

HÉMANGIOMES MULTIPLES
Nombre supérieur ou égal à 5
SUSPICION D'UN
HÉMANGIOME HÉPATIQUE

**Insuffisance
cardiaque**

HEMANGIOMES INFANTILES À HAUT RISQUE

RISQUE FONCTIONNEL

HI PALPÉBRAL

Altération de la fonction visuelle

• Amblyopie • Strabisme • Astigmatisme

HI LABIAL

Difficultés d'alimentation

Incidence possible sur le développement maxillo-dentaire

HI NASAL

Difficultés respiratoires

HI DES OREILLES

Fermeture du conduit auditif externe

Infection • Surdit

HI MAMMAIRE

Incidence possible sur le dveloppement mammaire

HI DE LA MAIN (ou du pied)

**Altration de la prhension
(ou de la mobilit)**

HEMANGIOMES INFANTILES À HAUT RISQUE

RISQUE D'ULCÉRATION

Localisations à risque¹
= zones de macération

HI LÈVRE INFÉRIEURE

HI COU

HI RÉGION ANOGÉNITALE

Type morphologique
à risque¹

GRAND HI SEGMENTAIRE

EN PHASE PROLIFÉRATIVE,
SIGNE PRÉMONITOIRE =
BLANCHIMENT CENTRAL^{2,3}

1. Chamlin SL, (2007) Multicenter prospective study of ulcerated hemangiomas. *J Pediatr* 151:684-689. 2. Hermans DJ (2011) Propranolol, a very promising treatment for ulceration in infantile hemangiomas: A study of 20 cases with matched historical controls. *J Am Acad Dermatol* 2011;64:833-8. 3. Maguiness - Early white discoloration of IH - *Arch Dermatol* - 2010

RISQUE D'ANOMALIES STRUCTURELLES ASSOCIÉES

SUSPICION DE SYNDROME
LUMBAR-SACRAL-PELVIS
HI SEGMENTAIRE ÉTENDU
AU NIVEAU DE LA RÉGION
MÉDIALE PÉRINÉALE
OU LOMBO-SACRÉE

**Risque d'anomalies
congénitales au niveau
du rachis, de l'appareil urinaire
ou anogénital**

SUSPICION DE
SYNDROME PHACE
HI SEGMENTAIRE ÉTENDU AU
NIVEAU DE LA TÊTE INCLUANT
LE CUIR CHEVELU, LE COU

**Risque d'anomalies congénitales
structurelles du cerveau,
cardiovasculaires, oculaires**

HEMANGIOMES INFANTILES À HAUT RISQUE

RISQUE DE DEFIGURATION

HI PALPÉBRAL

Déformation de la paupière

HI LABIAL

Déformation de la lèvre

HI NASAL

Déformation du cartilage du nez

Nécrose du cartilage

HI DES OREILLES

Déformation du cartilage des oreilles

HI SEGMENTAIRE DU VISAGE

Séquelles déformantes

HI ZONE CENTRO-FACIALE

Déformation du visage

1. Léauté-Labreze C. Et Al. Infantiles Hemangioma: Part II. Risks, complications and treatment. J. Eur Acad Dermatol Venereol 2011

FAUT-IL ATTENDRE AVANT D'ADRESSER ?

HI à haut risque au niveau
du visage

HI à haut risque au niveau
du tronc, des extrémités et du périnée

HI à haut risque au niveau
du tronc postérieur

**Dans ces cas, il y a urgence
L'adressage précoce est une nécessité**

D'après Krowchuk D et al M - Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas , PEDIATRICS Volume 143, number 1, January 2019:e20183475

FAUT-IL ATTENDRE AVANT D'ADRESSER ?

HI segmentaire du visage

- Haut risque de cicatrice
- Risque d'anomalies structurelles associées (par ex : PHACE)

Peut affecter la vision
Risque de défiguration

Augmentation du risque
d'ulcération

Risque de défiguration
ou distorsion des repères
anatomiques

FAUT-IL ATTENDRE AVANT D'ADRESSER ?

HI multiples ≥ 5
(quelque soit la taille)
pouvant être associés à
des hémangiomes hépatiques

**HI segmentaires
des extrémités :**

- Haut risque d'ulcération
- Risque d'épaississement,
d'atrophie, de cicatrices

HI périnéal ou périanal :
augmentation du risque
d'ulcération

FAUT-IL ATTENDRE AVANT D'ADRESSER ?

**HI segmentaire lombosacré
ou périnéal :**

- Haut risque d'ulcération
- Pouvant être associé à des anomalies structurelles (ex: syndrome LUMBAR)

HEMANGIOMES INFANTILES À HAUT RISQUE

RISQUES DE SÉQUELLES

▶ ANOMALIES RÉSIDUELLES SI NON TRAITÉES ◀

50-69%^{1,2,3} (100% HI segmentaire)

55%

Publi la plus récente³

Déformation des structure anatomique

84%
Télangiectasie

33%
Peau anétodermique

Alopecie

47%
Résidu fibro-graisseux

Cicatrice résiduelle

1. Bauland and coll. Untreated Hemangioma PRS Journal (27):4:2011
2. Enjolras O, Gelbert F. Superficial hemangiomas: Associations and management. *Pediatr Dermatol.* 1997;14:173-179.
3. Baselga et al. Risk Factors for degree and type of sequelae after involution of untreated hemangiomas of infancy. *JAMA.* 2016

HEMANGIOME INFANTILE (HI)

- ▶ Besoin crucial de voir les patients à temps : la plupart des hémangiomes ont atteint leur croissance complète vers 5 mois
- ▶ Faciliter l'identification des patients nécessitant d'être adressés à un centre expert pour la prise en charge de l'HI

¹ Léauté-Labrèze C et al. Infantile hemangioma. Lancet 277 Jul;390 (9089):856-9.

Parcours patients

Parents

Pédiatres &
Médecins généralistes:
Un Rôle clé ¹

Expert centers

Dermato-pédiatres
Dermatologues
Pédiatres
Chirurgien plasticien / Chirurgien vasculaire
Radiologue
Onco-hématologue

Diagnostic précoce

- Télédermatologie/smartphone
- Délais de rendez-vous raccourci
(assistantes formées)

Adressage précoce

- Outil de triage

Traitement à temps

IHReS INFANTILE
HEMANGIOMA
REFERRAL SCORE

1. Daniel P. Krowchuk, MD, FAAP. PEDIATRICS Volume 143, number 1 ,January 2019:e20183465

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

6. **IHReS** INFANTILE HEMANGIOMA REFERRAL SCORE

UN SCORE CLINIQUE

- ▶ Pour les pédiatres et les médecins généralistes
- ▶ Pour identifier les patients nécessitant d'être adressés vers un centre expert pour la prise en charge d'un HI
- ▶ Facile à utiliser et rapide à exécuter

ADRESSERIEZ-VOUS CE PATIENT POUR CET HÉMANGIOME INFANTILE ?

Source: PFD internal bank of images

UN NOUVEL OUTIL D'ÉVALUATION : DÉVELOPPEMENT & VALIDATION

IHReS Infantile
Hemangioma
Referral Score

E. Baselga Torres
Ch. Léauté-Labrèze
M. El Hachem
L. Weibel
L. Boon
A. Troilius Robin
A. Oranje

Par un Board
International et Indépendant
d'Experts des HI

Par les Pédiatres

Partie A – 6 questions (OUI or NON)

IHReS Infantile
Hemangioma
Referral Score

RÉPONDRE AUX QUESTIONS CI-DESSOUS,
COCHER OUI OU NON

NOM DU BÉBÉ :

ÂGE :

DATE D'APPARITION DE L'HÉMANGIOME : ___ / ___ / ___

CENTRE EXPERT :

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor) Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille) Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée Oui Non

Taille $\geq$ 4 cm (focal ou segmentaire) Oui Non

Nombre d'hémangiomes $\geq$ 5 Oui Non

**SI LA CASE "OUI" EST COCHÉE POUR AU MOINS L'UNE DES SITUATIONS,
MERCİ D'ADRESSER VOTRE PATIENT À UN CENTRE EXPERT.**

**SI LA CASE "NON" EST COCHÉE POUR TOUTES LES QUESTIONS,
COMPLÉTEZ LE TABLEAU DE LA PAGE SUIVANTE**

Remarque : En cas d'hémangiomes infantiles multiples, le score doit être calculé pour chaque hémangiome.

Partie B – 6 questions (Score)

IHReS Infantile
Hemangioma
Referral Score

POUR CHAQUE PARAMÈTRE, COCHER OUI OU NON

**LE SCORE TOTAL EST CONSTITUÉ PAR LA SOMME DES SCORES CORRESPONDANT
AUX PARAMÈTRES SUIVANTS :**

Paramètres	Items			Score <small>Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre</small>
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
TOTAL				

**SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.**

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Etape 1 : Sélection des cas cliniques

Sélection des cas cliniques par la Task Force
pour l'étude de validation du Referral Score IH IHReS

Accord sur **42 cas** représentatifs
de la pratique quotidienne

Etape 3: Validation du score par les Pédiatres et les Médecins généralistes

Médecins issus de 7 PAYS :

	RÉFERRER OUI/NON ?	Test IHReS	Re-test IHReS
Pédiatres	60	45	44
Nombre de cas évalués	2574	2106	1855

ROC ANALYSIS : Recherche de la sensibilité et de la spécificité optimales

UN NOUVEL OUTIL D'ÉVALUATION : VALEUR SCIENTIFIQUE

- ▶ Bon accord inter-individuel : Bonne fiabilité
- ▶ Bon accord intra-individuel à la fois pour les pédiatres et les experts : Bonne reproductivité
- ▶ Le niveau d'accord est supérieur pour les experts par rapport aux pédiatres

LE REFERRAL SCORE IH (IHReS)

- ▶ **Bonnes propriétés intrinsèques**
 - . Sensibilité 97 %
 - . Spécificité 55 %
- ▶ **Fiable et reproductible**
- ▶ **Facile à utiliser**

IHReS améliore la prise de décision pour les pédiatres et médecins généralistes lors de l'adressage des patients atteints d'HI

NEW HORIZON
IN INFANTILE HEMANGIOMA

7. Outils **IHReS**

RÉPONDRE AUX QUESTIONS CI-DESSOUS,
COCHER OUI OU NON

NOM DU BÉBÉ : _____
 ÂGE : _____
 DATE D'APPARITION DE L'HÉMANGIOME : _/ _/ _
 CENTRE EXPERT : _____

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor) Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille) Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire) Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5 Oui Non

SI LA CASE "OUI" EST COCHÉE POUR AU MOINS L'UNE DES SITUATIONS,
MERCİ D'ADRESSER VOTRE PATIENT À UN CENTRE EXPERT.

SI LA CASE "NON" EST COCHÉE POUR TOUTES LES QUESTIONS,
COMPLÉTEZ LE TABLEAU DE LA PAGE SUIVANTE

Remarque : En cas d'hémangiomes infantiles multiples, le score doit être calculé pour chaque hémangiome.

POUR CHAQUE PARAMÈTRE, COCHER OUI OU NON

LE SCORE TOTAL EST CONSTITUÉ PAR LA SOMME DES SCORES CORRESPONDANT
AUX PARAMÈTRES SUIVANTS :

Paramètres	Items	Oui	Non	Score <small>(Si non : 0 point)</small>	Score <small>Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre</small>
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐	☐	3	3 2 0
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐	☐	2	
Taille du plus grand hémangiome	≥ 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐	☐	3	3 2 0
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☐	☐	2	
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐	☐	3	3 2 0
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐	☐	2	
TOTAL					

SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Bloc de 15 feuillets

IHReS

Infantile
Hemangioma
Referral Score

RÉPONDRE AUX QUESTIONS CI-DESSOUS,
COCHER OUI OU NON

NOM DU BÉBÉ :

ÂGE :

DATE D'APPARITION DE L'HÉMANGIOME : ___ / ___ / ___

CENTRE EXPERT :

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor) Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille) Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée Oui Non

Taille $\geq$ 4 cm (focal ou segmentaire) Oui Non

Nombre d'hémangiomes $\geq$ 5 Oui Non

**SI LA CASE "OUI" EST COCHÉE POUR AU MOINS L'UNE DES SITUATIONS,
MERCİ D'ADRESSER VOTRE PATIENT À UN CENTRE EXPERT.**

**SI LA CASE "NON" EST COCHÉE POUR TOUTES LES QUESTIONS,
COMPLÉTEZ LE TABLEAU DE LA PAGE SUIVANTE**

Remarque : En cas d'hémangiomes infantiles multiples, le score doit être calculé pour chaque hémangiome.

IHReS

Infantile
Hemangioma
Referral Score

POUR CHAQUE PARAMÈTRE, COCHER OUI OU NON

LE SCORE TOTAL EST CONSTITUÉ PAR LA SOMME DES SCORES CORRESPONDANT AUX PARAMÈTRES SUIVANTS :

Paramètres	Items			Score Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐ Oui ☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☐ 0
TOTAL				

**SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.**

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

<http://www.ihscoring.com>

ACCES LIBRE SANS CODE

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ
Carte avec système de géolocalisation

TROUVEZ UN
CENTRE EXPERT

- ➔ **Partie outil de scoring**
 - ➔ **Edition Pdf et impression**
 - ➔ **Envoi pdf par mail**

- ➔ **Partie training – 6 cas cliniques**

Marque page
Mémorisation URL

Cas cliniques IHReS

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 1

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Fille, 2 mois et demi

Est apparu quelques jours après la naissance
Hémangiome toujours en croissance

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 2

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Fille, 3 mois

Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 3

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Fille, 2 mois

Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 4

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Fille, 1 mois

Présent à la naissance
Hémangiome en croissance rapide
1,5 cm

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 5

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Garçon, 3 mois

Est apparu 1 semaine après la naissance
Hémangiome toujours en croissance
3 cm

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

IHReS CAS CLINIQUES
CAS 6

IHReS Infantile Hémangiome Referral Score

Fille, 3 mois et demi

Hémangiome stable

<http://www.thecoring.com>

Source: PFD Internal bank of images

HÉMANGIOMES INFANTILES SCORE IHRES OUTILS CAS CLINIQUES

Fille, 2 mois et demi

Est apparu quelques
jours après la naissance
Hémangiome toujours
en croissance

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Fille, 2 mois et demi
Est apparu quelques jours après la naissance
Hémangiome toujours en croissance

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

> À ADRESSER

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Fille, 3 mois

Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Fille, 3 mois
Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

IHReS CAS CLINIQUES

CAS 2 - CORRECTION

Paramètres	Items			Score Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre			
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☒ 3	☐ 2	☐ 0
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)			
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3	☐ 2	☒ 0
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)			
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3	☐ 2	☒ 0
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)			
TOTAL							3

SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.

> NE PAS ADRESSER, SURVEILLANCE ACTIVE

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Fille, 2 mois

-

Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Fille, 2 mois
Présent à la naissance
L'hémangiome est stable

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

IHReS CAS CLINIQUES

CAS 3 - CORRECTION

Paramètres	Items			Score Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
TOTAL				2

SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.

> NE PAS ADRESSER, SURVEILLANCE ACTIVE

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

* LEAUTE-LABREZE C. et al. The Infantile Hemangioma Referral Score: A Validated Tool for Physicians. Pediatrics. 2020;145(4):e20191628.

Fille, 1 mois

Présent à la naissance
Hémangiome
en croissance rapide
1,5 cm

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Fille, 1 mois
Présent à la naissance
Hémangiome en croissance rapide - 1,5 cm

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

> À ADRESSER

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Garçon, 3 mois

Est apparu 1 semaine
après la naissance
Hémangiome toujours
en croissance
3 cm

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Garçon, 3 mois
Est apparu 1 semaine après la naissance
Hémangiome toujours en croissance - 3 cm

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Paramètres	Items			Score Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre	
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☐ 2 ☒ 0
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☒ 2 ☐ 0
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)	☐ 3 ☒ 2 ☐ 0
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)	
TOTAL				4	

SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.

> À ADRESSER

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

Fille, 3 mois et demi

-

Hémangiome stable

<http://www.ihscoring.com>

Source: PFD internal bank of images

Fille, 3 mois et demi
Hémangiome stable

Complications ou risque potentiel de complications (ulcération, atteinte visuelle, difficulté d'alimentation, stridor)

Oui Non

Atteinte de la partie centrale du visage ou des oreilles

Oui Non

Atteinte de la région mammaire (chez la fille)

Oui Non

Atteinte médiane de la région lombo-sacrée

Oui Non

Taille ≥ 4 cm (focal ou segmentaire)

Oui Non

Nombre d'hémangiomes ≥ 5

Oui Non

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.

IHReS CAS CLINIQUES

CAS 6 - CORRECTION

Paramètres	Items			Score Ne prenez en compte que le score le plus élevé pour chaque paramètre
Localisation de l'hémangiome	Sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	Cou, cuir chevelu ou région périnéo-fessière (sous la couche)	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
Taille du plus grand hémangiome	≥ à 1 cm sur le visage en dehors des zones mentionnées précédemment	☒ Oui	☐ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	2-4 cm sur les parties du corps en dehors de celles mentionnées précédemment	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
Âge de l'enfant et cinétique de l'hémangiome	Le nourrisson a < 2 mois	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 3 points (Si non : 0 point)
	Le nourrisson a ≥ 2 mois et ≤ 4 mois, avec un hémangiome dont la croissance est évidente au cours des 2 dernières semaines	☐ Oui	☒ Non	Si oui : 2 points (Si non : 0 point)
TOTAL				6

SCORE ≥ 4, LE PATIENT DOIT ÊTRE ADRESSÉ À UN SPÉCIALISTE.
SCORE < 4, LE PATIENT NE DOIT PAS ÊTRE ADRESSÉ, IL DOIT ÊTRE SUIVI ET LE SCORE DOIT ÊTRE RÉALISÉ À CHAQUE VISITE.

> À ADRESSER

La décision finale de référer le patient à un centre expert est à la discrétion du médecin et des parents.